	Soins de cordon du nouveau-né en maternité et à domicile		
	Réseau Périnatal des 2 Savoie	www.rp2s.fr Onglet Protocoles NN	Création CPIAS-FRPN janvier 2020 Adaptation RP2S mars 2020
Validation comité scient sept 2020 (et ajout résumé page 2)			

Objectif - domaine d'application - définition

Objectifs : favoriser une chute rapide du cordon et une bonne cicatrisation / prévenir l'infection du cordon, l'omphalite et ses complications / harmoniser les pratiques et les conseils aux parents

Document support à destination des maternités et des professionnels du RP2S, quel que soit leur mode d'exercice.

Omphalite : Infection du moignon ombilical avec 4 grades de sévérité

- grade 1 : sécrétions purulentes, cordon malodorant,
- grade 2 : érythème péri ombilical, cellulite,
- grade 3 : omphalite avec signes d'infection systémique,
- grade 4 : omphalite avec fasciite nécrosante, septicémie, choc.

1 – Quand et comment effectuer le soin de cordon

Conseils généraux :

- A la naissance, conserver l'antisepsie pour la section du cordon.
- Laisser le cordon hors de la couche.
- Le peau à peau permet la colonisation du cordon par des bactéries non pathogènes.

Quand ? Le soin de cordon est effectué jusqu'à cicatrisation complète :

- systématiquement une fois par jour,
- et chaque fois qu'il y a présence de souillures sur le cordon : selles, urines, sérosités ...,
- soit au moment du bain, soit au moment d'un change en l'absence de bain.

Qui ? Soins effectués par les parents du nouveau-né après éducation au soin lors du séjour en maternité.

Matériel :

- savon doux liquide à pH neutre sans colorant ni parfum
- compresses non stériles en intissé
- en maternité : matériel individuel, pas de partage entre nouveau-nés.

Respect des précautions standard :

- pour le professionnel de santé :
 - o désinfection des mains par friction avec un produit hydro-alcoolique
 - o si souillure par selles / urines / sérosité / écoulement : port de gants à usage unique
 - o si toilette / bain en même temps : port de tablier à usage unique.
- pour les parents :
 - o lavage des mains au savon doux
 - o séchage avec un essuie-main à usage unique ou une serviette dédiée au soin.

2 – Modalités précises du soin avec bain / sans bain

- **Nettoyer** le cordon avec une compresse imbibée d'eau tiède et de savon.
- **Rincer** :
 - o avec bain : pendant le bain
 - o sans bain : avec une compresse imbibée d'eau tiède jusqu'à élimination de toute trace de savon sur le cordon et sa base.
- **Sécher** :
 - o avec bain : serviette de toilette propre puis séchage rigoureux du cordon et de sa base par tamponnement avec une compresse non stérile.
 - o sans bain : séchage rigoureux du cordon et de sa base par tamponnement avec une compresse non stérile
- **Tracer** le soin (en maternité)







3 – Comment surveiller le cordon

La surveillance du cordon est quotidienne.

Les parents doivent être informés des signes infectieux d'alerte qui doivent amener à consulter :

- aspect inhabituel du cordon ou de la région péri ombilicale,
- cordon malodorant, sécrétions purulentes, érythème péri-ombilical.

L'apparition de signes d'alerte doit conduire les parents à consulter le jour même un professionnel de santé (maternité, sage-femme, PMI, médecin généraliste, pédiatre ...).

NETTOYAGE DU CORDON OMBILICAL EN MATERNITE ET A DOMICILE Une fois par jour minimum, + si souillure					
RP2S 2020					
Matériel	Savon doux, pH neutre, sans colorant ni parfum. Compresse s non stériles en intissé En maternité : matériel individuel	Au moment du bain 	En dehors du bain 		
		Avant le soin Respect des précautions standard		Personnel  Désinfection des mains par friction avec un produit hydro-alcoolique. Si souillure par selles / urines / sérosité / écoulement : port de gants à usage unique. 	
		+ port tablier à usage unique. 			
		Parents  Lavage des mains au savon doux. Séchage avec un essuie-main à usage unique ou une serviette dédiée au soin.			
Déroulement du soin	Nettoyer	Avec une compresse imbibée d'eau tiède et de savon.			
	Rincer	Dans le bain		Avec compresse imbibée d'eau tiède. Elimination de toute trace de savon sur le cordon et sa base.	
	Sécher	Serviette de toilette propre, puis séchage rigoureux du cordon et de sa base par tamponnement avec compresse. Laisser le cordon en dehors de la couche.		Séchage rigoureux du cordon et de sa base par tamponnement avec une compresse. Laisser le cordon en dehors de la couche.	
Surveillance quotidienne		Si sécrétions purulentes, cordon malodorant, érythème périombilical : → avis sage-femme ou pédiatre, et antiseptique type Dakin® ou Biseptine®			