



Ce référentiel est le fruit d'un travail collaboratif entre les réseaux de périnatalité de la région, la cellule de transferts périnataux ainsi que la filière Pédi'Ara du réseau Urg'Ara

CRTP ARA



NIVEAU DE SOINS DURANT LE TRANSFERT : CHOIX DU VECTEUR

DÉTRESSE RESPIRATOIRE INITIALE (< 3 premières heures de vie) avec :

- AG ≥ 35
- Silverman < 4 et FiO₂ ≤ 25% ET SpO₂ ≥ 92% et
- Radiographie normale ou en faveur d'un retard de résorption
- Sans aggravation évolutive

SI ABSENCE D'AU MOINS 1 CRITERE POUR UN VECTEUR PARAMEDICALISE

DONT :

- Détresse respiratoire secondaire
- FiO₂ ≥ 25%
- Radiographie pathologique (Pneumothorax, épanchement, MMH)
- Apnée récidivante
- Nécessité d'un vecteur médicalisé pour bilan, réévaluation et orientation en fonction de la réévaluation

VECTEUR PARAMEDICALISE

En absence de vecteur paramédicalisé disponible dans un délai compatible avec l'état de l'enfant évalué par la Cellule en lien avec le demandeur, le receveur et le référent néonatalogue : vecteur médicalisé

VECTEUR MEDICALISE

