

Immunisation contre le virus respiratoire syncytial (VRS)

BEYFORTUS® (Nirvesimab) 50mg et 100mg
 Solution injectable en seringue pré remplie

DONNÉES PHARMACOLOGIQUES

Anticorps monoclonal humain recombinant neutralisant à action prolongée dirigé contre le Virus respiratoire syncytial (VRS).

D'après les données cliniques et pharmacocinétiques, **la durée de protection est d'au moins 5 mois.**

Remarque : il s'agit d'un anticorps monoclonal et non d'un vaccin → immunisation passive.

INDICATIONS

Prévention des infections respiratoires inférieures dues au VRS chez les nouveau-nés et nourrissons au cours **de leur première saison d'exposition au VRS.**

Option thérapeutique de première intention en alternative au Synagys®.

- **Nourrissons de moins de 6 mois**
- **Nourrissons nés à partir du 6 février 2023**
- **Nouveaux nés dès la naissance**

POSOLOGIES

Deux posologies en fonction du poids de l'enfant :

- **Poids < 5kg** : utilisation d'une seringue à 50mg / 0,5 ml
- **Poids ≥ 5kg** : utilisation d'une seringue à 100mg/ 1 ml

Conditionnement **unitaire.**

CIRCUIT DE DISTRIBUTION

A L'HÔPITAL

= dès la naissance et avant la sortie de la maternité

- Prescription par un médecin ou une sage-femme.
- Commande sans facturation directement auprès du **laboratoire SANOFI.**
- La dotation initiale de l'établissement correspond à la moyenne des naissances sur 15 jours.
 > **Ne pas transférer l'intégralité du stock** dans les services d'obstétrique ou de maternité à réception **mais fractionner l'allocation** pour assurer un suivi fin de l'utilisation des doses et du besoin de réapprovisionnement.

EN OFFICINE

= En cas de non-administration à l'hôpital

- Délivrance sur prescription médicale* (médecin, sage-femme).
- Commande directement auprès du laboratoire SANOFI sur un formulaire (possibilité de commander 5 unités) et non auprès des grossistes.
- Médicament non facturé, honoraires de dispensation.

*Prescription en PMI possible avec délivrance en officine



Beyfortus® 50 mg (boîte violette)



Beyfortus® 100 mg (boîte bleue)

ADMINISTRATION

Seringue pré remplie prête à l'emploi (conservation 2°C-8°C).

- **Après sortie du réfrigérateur**, utilisation possible dans les 8h et à l'abri de la lumière.
- Administration par **médecin, infirmiers** ou **sage-femme.**



Administration INTRA-MUSCULAIRE

- De préférence dans la partie **antérolatérale** de la cuisse.
- Possibilité de **co-administration** avec tous les vaccins.

TRAÇABILITÉ

Pour les patients

Traçabilité dans le **cahier de santé** de l'enfant (date, dose, lot, étiquette)

Pour les établissements de santé

- Traçabilité dans le **dossier patient**
- Suivi des stocks dans **eDISPOSTOCK**
- Traçabilité des administrations dans le **PMSI**

En cours d'hospitalisation :

- sur le fichier « FICHCOMP LES » pour les ets ex DG
- sur le fichier « RSF H » pour les ets ex OQN

Rattrapage